

**NOME DO PACIENTE:** \_\_\_\_\_

**LEITO:** \_\_\_\_\_ **TEMPO DE TRATAMENTO:** \_\_\_\_\_

**POSOLOGIA:** \_\_\_\_\_ **DATA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**OBS 1: PACIENTE DE ALTA DESTE SERVIÇO DE SAÚDE EM TRATAMENTO MEDICAMENTOSO INICIADO COM ERTAPENEM IM.**

I. Foram dispensados para o paciente:

- Ertapenem de 1g - \_\_\_\_\_
- Cloridrato de Lidocaína 2% sem vasoconstrictor - \_\_\_\_\_
- Seringa 5ml - \_\_\_\_\_
- Agulha 40x12 - \_\_\_\_\_
- Agulha 25x7 - \_\_\_\_\_

II. Reconstituição do Ertapenem será realizada somente pelo profissional da saúde da seguinte forma:

- a. Reconstitua o conteúdo de um frasco - ampola de 1 g de ertapenem com 3,2 mL de cloridrato de lidocaína a 2,0% (sem vasoconstrictor).
- b. Agite o frasco- ampola energicamente até formar uma solução.
- c. Aspire imediatamente o conteúdo do frasco-ampola e administre por injeção intramuscular (IM) profunda em massa muscular grande (como os músculos glúteos ou a parte lateral da coxa).
- d. A solução reconstituída IM deve ser utilizada em até 1 hora após o preparo.

**OBS 2: APÓS O TÉRMINO DO TRATAMENTO, DEVERÁ SER REAVALIADO NO RETORNO COM O INFECTOLOGISTA.**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura Farmacêutico Clínico / nº do CRF**